



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL

I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM



ANGINA DE LUDWIG ASSOCIADA A ABSCESSO CERVICAL - RELATO DE CASO

Vilma Leão Barbosa Neta¹, José Ricardo Mikami², Camilla Alves de Carvalho³,
Everânia da Silva⁴, Fernanda Vieira França de Almeida⁵, Francisco de Assis Crescencio
Vergetti⁶, Nayara Cavalcante Peixoto⁷

viilmaleao@hotmail.com, ricardomikami@hotmail.com,
camillacarvalho25@hotmail.com; everania.500@gmail.com;
vieirafernandaf@gmail.com; vergetti18@gmail.com; peixoto.nay@gmail.com

¹ *Graduanda do curso de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL*

² *Cirurgião Buco-maxilo-facial do Hospital Geral do Estado - HGE*

³ *Graduanda do curso de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas*

⁴ *Graduanda do curso de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL*

⁵ *Graduanda do curso de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL*

⁶ *Graduando do curso de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL*

⁷ *Graduanda do curso de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL*

Descrita em 1836 por Wilhelm Friedrich Von Ludwig, a Angina de Ludwig consiste num processo infeccioso agressivo de rápida disseminação que envolve bilateralmente os espaços faciais submandibular, sublingual e submentoniano, sendo de etiologia odontogênica em 90% dos casos. Apresenta relevante destaque, uma vez que sua evolução pode colocar em risco a vida do paciente, seja pela obstrução das vias aéreas, secundária ao edema sublingual e submandibular ou, numa fase mais tardia, levar à mediastinite, fascíte necrosante ou sepse. A sintomatologia típica inclui dor, aumento de volume em região cervical, disfagia, odinofagia, trismo, edema do assoalho bucal, protusão lingual, febre e linfadenopatia. O tratamento da Angina de Ludwig baseia-se, principalmente, na tríade, manutenção das vias aéreas superiores pervias, terapia antibiótica endovenosa apropriada e drenagem cirúrgica, considerando a hidratação parenteral e a remoção do foco infeccioso. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma Angina de Ludwig cuja causa inicial foi uma cárie no primeiro molar



I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL

I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS



II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

inferior esquerdo, evoluindo rapidamente com grande aumento volumétrico em região cervical e estreitamento das vias aéreas, atingindo região cervical, necessitando de rápida abordagem cirúrgica com drenagem e antibioticoterapia endovenosa com Amoxicilina-Ácido Clavulânico e Metronidazol. O caso clínico demonstra o real potencial de gravidade das infecções odontogênicas, sendo que o dentista deve estar apto a diagnosticá-la precocemente e conduzir ao tratamento adequado, em ambiente hospitalar, sendo de fundamental importância para a sobrevivência do paciente.

Palavras-chave: Angina de Ludwig. Infecção odontogênica. Abscesso cervical.